

Sécurité alimentaire




Bactérie lactique probiotique revivifiable en poudre, couramment utilisée par l'industrie agroalimentaire et parfaitement sûre pour son utilisation chez l'homme dans des compléments alimentaires. Cette espèce est répertoriée par l'EFSA dans la liste de microorganismes à usage alimentaire (QPS "Qualified Presumption of Safety list" 2013).

Ne contient pas d'allergènes selon le Règlement Européen 1169/2011.

Viabilité



La cytométrie en flux permet d'analyser la viabilité des cellules, une à une, à l'aide d'un composé fluorescent, marqueur de l'intégrité de la membrane de **Bfbi2**.



- 10 % de cellules mortes
- 15 % de cellules endommagées
- 75 % de cellules intactes

Stabilité en poudre



Correctement formulé en sachet ou en gélule, **Bfbi2** est une souche **stable** à 20°C.

Durée (Mois)	20°C		25°C / 60% HR	
	Viabilité (UFC/g)	Milliard(s) par unité	Viabilité (UFC/g)	Milliard(s) par unité
0	1,1E+10	77	1,1E+10	77
3	8,1E+09	57	7,3E+09	51
6	7,9E+09	55	7,2E+09	50
9	8,0E+09	56	7,3E+09	51
12	7,5E+09	53	5,0E+09	35
18	7,8E+09	55	5,8E+09	41
24	6,7E+09	47	4,5E+09	32


UFC : Unité Formant Colonie; HR : Humidité Relative

Plus de 60% de la viabilité initiale encore présente après 2 ans de conservation à 20°C.

Adhésion à la muqueuse intestinale




Bfbi2 adhère **correctement** à la surface des cellules Caco-2 (cellules intestinales humaines).



Propriétés immunomodulatrices



Bfbi2 présente un profil immunitaire **intermédiaire** *in vitro* (modèle PBMC, cellules mononuclées de sang périphérique).



Ces données techniques sont fournies à nos clients à titre d'information et sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement. Des informations supplémentaires ainsi que les protocoles expérimentaux d'évaluation *in vitro* des propriétés probiotiques peuvent être fournis sur simple demande.